

DOCUMENTO 46 — REVISIÓN 6

Teorema geométrico-topológico de estabilidad, espacios de soluciones y conexión con la Hipótesis de Riemann

Marco: Einstein–VED · UNIHOLOG

Autor: Víctor Estrada Díaz

Carácter del documento: versión final autocontenida del desarrollo deductivo.

Principio metodológico: una definición se introduce una vez; una proposición demostrada queda asentada y puede utilizarse posteriormente sin reabrir su demostración. Si una conclusión se sigue de las proposiciones asentadas, se afirma con la fuerza lógica que corresponde.

o. Regla de lectura y notación lógica

Este documento utiliza la siguiente convención:

- D_X : definición.
- A_X : antecedente establecido fuera de este documento y citado como punto de partida.
- P_X : proposición demostrada dentro del desarrollo.
- T_X : teorema obtenido a partir de proposiciones anteriores.
- $\therefore$: por tanto.

Una proposición demostrada no vuelve a convertirse posteriormente en una hipótesis. Puede ser citada como antecedente mediante su identificador.

1. Universo, coordenadas y geometría diferencial

1.1. Universo

D_U — El universo físico considerado se representa como

$$U = 3S + T .$$

No se elimina ninguna dimensión espacial.

1.2. Elección local de la dirección de propagación

Sea una onda que en un punto determinado se propaga según una dirección espacial. Es lícito orientar localmente los ejes de coordenadas de manera que el eje x coincida con la dirección instantánea de propagación.

Entonces, para ese desplazamiento infinitesimal,

$$dy = 0, \quad dz = 0,$$

y

$$ds = dx .$$

P_{COORD} — Esta elección no reduce $3S$ a una dimensión. Sólo alinea una coordenada con la dirección local de propagación.

2. Significado de t' y relación de Lorentz

2.1. Convención esencial sobre el apóstrofo

$D_{t'}$ — El apóstrofo de t' **no significa derivada**.

t' representa la coordenada temporal propia del sistema observado respecto del observador en la transformación de Lorentz. En consecuencia, dt' es el diferencial del tiempo propio del sistema observado.

Cuando sea necesaria una derivada se escribirá explícitamente, por ejemplo,

$$\frac{dt'}{dt} .$$

2.2. Antecedente de Lorentz

A_L — Para velocidad relativa v ,

$$dt' = dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

Definimos la velocidad longitudinal observada como

$$v = \frac{ds}{dt}.$$

En unidades naturales,

$$c = 1.$$

Por tanto,

$$dt'^2 = dt^2 - ds^2,$$

y obtenemos

$$P_{ST}: \quad ds^2 = dt^2 - dt'^2.$$

Equivalentemente,

$$ds^2 = (dt - dt')(dt + dt').$$

Estas dos expresiones son la misma relación geométrica escrita de dos formas.

3. Primer y segundo orden: velocidad y aceleración

La primera derivada espacial respecto de t es

$$P_v: \quad \frac{ds}{dt} = v.$$

Cuando v es constante,

$$\frac{d^2s}{dt^2} = 0.$$

La segunda derivada es

$$P_a: \quad \frac{d^2s}{dt^2} = \frac{dv}{dt} = a.$$

Dentro del marco Einstein–VED, la presencia de materia se asocia al confinamiento de onda y a la existencia de dinámica no puramente lineal; la aceleración expresa la variación del régimen de velocidad.

La geometría define por tanto una estructura diferencial en t, t' y sus variaciones. No se añade desde fuera una segunda geometría para introducir la dinámica.

4. Onda base, longitud de cierre y radio R_{VED}

4.1. Longitud de onda base

D_λ — Sea λ la longitud de onda base asociada a la materia considerada.

A partir de las relaciones de Planck y Einstein,

$$E = \frac{hc}{\lambda},$$

$$E = Mc^2,$$

se obtiene

$$Mc^2 = \frac{hc}{\lambda},$$

y por tanto

$$\lambda = \frac{h}{Mc}.$$

4.2. Longitud de contorno

D_L — Sea L la longitud total del contorno espacial recorrido por una onda confinada; es el perímetro de cierre de la onda.

Definimos

$$L = n\lambda.$$

Para un cierre finito,

$$n \in R^+.$$

4.3. Construcción de U_{VED}

$D_{R_{VED}}$ — Se representa topológicamente el contorno de longitud L mediante una circunferencia bidimensional de igual longitud:

$$2\pi R_{VED} = L .$$

Por tanto,

$$R_{VED} = \frac{L}{2\pi} = \frac{n\lambda}{2\pi} .$$

La afirmación no es que el confinamiento físico real en $3S + T$ tenga necesariamente forma circular. La circunferencia es una proyección topológica precisa que conserva la longitud L y permite analizar las propiedades de cierre.

Así,

$$U_{VED}(\text{onda}) = U_{VED}(\text{cerrada, abierta}) = U_{VED}(R_{VED}) = U_{VED}(L, R_{VED}) .$$

$P_{VED}(\text{Inv})$ — La representación circular conserva L, λ, n y, como se definirá enseguida, ρ . Por ello no crea la estabilidad: la hace visible.

5. Ondas cerradas, ondas abiertas y estabilidad

5.1. Onda cerrada

Para todo n finito positivo,

$$L = n\lambda < \infty ,$$

y existe un contorno finito de representación.

El hecho de estar cerrada **no implica** estabilidad.

5.2. Onda abierta

La onda abierta o libre corresponde al límite

$$n \rightarrow \infty .$$

Entonces,

$$L \rightarrow \infty ,$$

$$R_{VED} \rightarrow \infty .$$

No existe un contorno espacial finito de retorno:

$$n \rightarrow \infty \Leftrightarrow L \rightarrow \infty \Leftrightarrow R_{VED} \rightarrow \infty \Leftrightarrow \text{onda abierta o libre} .$$

Dentro del marco, la onda libre corresponde a energía.

6. Coordenadas completas de cierre:

k y ρ

6.1. Entero más próximo y distancia

D_k — Sea $k \in N^+$ el entero positivo más próximo que sirve como centro de una familia de cierre.

D_ρ — Sea

$$\rho = \text{dist} (n, N^+) .$$

Por definición de distancia al entero más próximo,

$$0 \leq \rho \leq \frac{1}{2} .$$

Todo cierre finito se representa como

$$n = k \pm \rho , \qquad k \in N^+ , \qquad 0 \leq \rho \leq \frac{1}{2} .$$

En el punto exactamente equidistante entre dos enteros, $\rho = 1 / 2$; las dos etiquetas vecinas representan la misma frontera.

Entonces

$$L(k, \rho) = (k \pm \rho) \lambda ,$$

y

$$R_{VED} (k, \rho) = \frac{(k \pm \rho) \lambda}{2 \pi} .$$

6.2. Estabilidad

Si

$$\rho = 0,$$

entonces

$$n = k,$$

y

$$L = k\lambda .$$

El contorno contiene un número entero de ciclos y el retorno se produce exactamente en fase.

Por tanto,

$$P_{VED}(E): \quad \rho = 0 \Leftrightarrow n = k \in N^+ \Leftrightarrow L = k\lambda \Leftrightarrow \text{cierre exacto en fase} \Leftrightarrow \text{estado estable} .$$

Para

$$0 < \rho \leq \frac{1}{2},$$

el cierre es finito pero no entero. Existe desfase respecto del cierre exacto:

$$P_{VED}(I): \quad 0 < \rho \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \text{cierre no estable} .$$

El extremo

$$\rho = \frac{1}{2}$$

es la máxima desviación posible respecto del entero más próximo.

7. Completitud de U_{VED}

La parametrización anterior es exhaustiva.

Para todo $n \in R^+$ finito existe algún

$$k \in N^+$$

y algún

$$\rho \in [0, \frac{1}{2}]$$

tales que

$$n = k \pm \rho \, .$$

Por tanto no existe un cierre finito fuera de esta clasificación.

$$P_{\text{VED}}(K_E) \text{ -- Para } \rho = 0,$$

$$E_{\text{VED}} = \{(k, 0): k \in N^+ \} \, .$$

Todos los enteros

$$k = 1, 2, 3, \ldots$$

enumeran todos los casos de estabilidad sin dejar ninguno fuera.

$P_{\text{VED}}(K_I)$ -- Para $\rho = 1 / 2$, los mismos k enumeran todas las fronteras de máxima desviación.

$$P_{\text{VED}}(R_C) \text{ -- Para cada familia } k,$$

$$0 \leq \rho \leq \frac{1}{2}$$

recorre todo el continuo entre cierre exacto y máxima desviación.

Por tanto,

$$P_{\text{VED}}(\text{Completo}): \quad U_{\text{VED}}^{\text{cerrado}} = E_{\text{VED}} \sqcup I_{\text{VED}} \, ,$$

y, añadiendo el límite $n \rightarrow \infty$, queda contemplada también la onda abierta.

No existe una cuarta clase de onda respecto del cierre que no haya sido considerada.

8. Precedente topológico:

$$U_{\text{VED}} \leftrightarrow U_{\text{Sch}}$$

El resultado geométrico de relación de radios, desarrollado con mayor detalle en el Documento 7, se reproduce aquí como antecedente interno del marco.

A_7 -- En dicho documento se establece la constante geométrica

$$\tilde{N} = R_{VED} R_{Sch} \; .$$

Por tanto,

$$R_{Sch} = \frac{\tilde{N}}{R_{VED}},$$

y

$$R_{VED} = \frac{\tilde{N}}{R_{Sch}} \; .$$

Para radios positivos, la aplicación

$$\Phi_{\tilde{N}}:R_{VED} \mapsto \frac{\tilde{N}}{R_{VED}}$$

es biyectiva, continua y su inversa tiene la misma forma. En ese dominio,

$$P_{VS}: \qquad U_{VED} \cong U_{Sch} \; .$$

Este resultado demuestra que una misma información física puede representarse en topologías distintas mediante una transformación reversible.

En ese desarrollo de relación de radios, la función gravitatoria del marco depende del cierre n y satisface

$$G(2) = G,$$

mientras que para onda libre

$$\lim_{n \rightarrow \infty} G(n) = 0 \; .$$

Así, dentro del marco, el estado $n = 2$ fija la gravitación universal observada y el límite de onda libre no aporta respuesta gravitatoria.

El objetivo de esta sección no es utilizar U_{Sch} para obtener Riemann, sino establecer un precedente demostrado: es posible transportar información entre topologías conservando el estado representado.

9. Ecuación diferencial completa del universo

Volvemos ahora a la geometría ya demostrada:

$$P_{ST}: \quad ds^2 = dt^2 - dt'^2.$$

La ecuación dinámica se construye conservando la relación diferencial y su variación respecto de t :

$$P_F: \quad F = (dt^2 - dt'^2) + \frac{d}{dt}(dt^2 - dt'^2).$$

No se elimina dt' antes de desarrollar la expresión.

Desarrollando respecto de t en la notación adoptada en este marco,

$$P_{F1}: \quad F = dt^2 - dt'^2 + 2dt - 2dt' \frac{dt'}{dt}.$$

La única prima presente en dt' continúa significando tiempo propio del observado; la derivada aparece sólo en el cociente explícito dt' / dt .

10. Condición propia de la onda y reducción final de F

La onda viaja localmente a c tanto si es libre como si está confinada:

$$P_W: \quad v_{\text{onda}} = c.$$

En unidades naturales,

$$c = 1.$$

Como

$$v = \frac{ds}{dt},$$

para la onda

$$\frac{ds}{dt} = 1.$$

Esto implica igualdad numérica de las diferenciales de propagación en esas unidades,

$$ds = dt,$$

sin afirmar que espacio y tiempo sean la misma entidad.

Por Lorentz,

$$dt' = dt\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

En el límite de la onda,

$$v \rightarrow c,$$

se obtiene

$$dt' \rightarrow 0.$$

En el desarrollo adoptado, en ese mismo límite,

$$dt'^2 \rightarrow 0,$$

y

$$\frac{dt'}{dt} \rightarrow 0.$$

Sólo ahora aplicamos estas condiciones a P_{F1} :

$$P_{F2}: \quad F = dt^2 + 2dt.$$

Factorizando,

$$dt^2 + 2dt = 2dt(1 + \frac{1}{2}dt),$$

por lo que

$$P_{F3}: \quad F = 2dt(1 + \frac{1}{2}dt).$$

El factor

$$\frac{1}{2}$$

aparece algebraicamente en la factorización de F .

No procede de Riemann.

No se introduce como normalización elegida.

No se obtiene suponiendo previamente la recta crítica.

11. Construcción de U_{Lap}

Una vez expuestas las ecuaciones diferenciales respecto de t , puede construirse su representación de Laplace.

D_{Lap} — La coordenada espectral compleja se escribe manteniendo siempre el par conjugado:

$$s_{\pm} = a \pm i b \; .$$

La parte real y la parte imaginaria cumplen funciones distintas.

Desde P_{F3} se obtiene el desplazamiento algebraico central

$$a = \tfrac{1}{2}$$

como lugar geométrico del regulador.

La parte imaginaria se obtiene de la periodicidad de fase del cierre.

Para un contorno

$$T(k,\rho)=(k\pm\rho)\lambda$$

en unidades $c=1$, la condición fundamental de fase es

$$e^{\pm i b T} = 1 \; .$$

Para una vuelta fundamental,

$$bT=2\pi \; .$$

Por tanto,

$$b(k,\rho)=\frac{2\pi}{(k\pm\rho)\lambda} \; .$$

Para los cierres estables,

$$\rho=0,$$

queda

$$b_k=\tfrac{2\pi}{k\lambda} \; .$$

y la imagen estable es

$$Z_{\text{VED}}\rightarrow_{\text{Lap}}=\left\{\tfrac{1}{2}\pm i\tfrac{2\pi}{k\lambda}:k\in N^+\right\} \; .$$

$P_{\text{Lap}}(Z)$ — Todos los estados estables de U_{VED} aparecen como puntos discretos de la recta

$$\Re(s)=\tfrac{1}{2} \; .$$

La recta completa no es el conjunto de estados estables. Puede contener puntos que no correspondan a ningún k estable. La estabilidad corresponde a los puntos discretos enumerados por k .

12. Qué queda asentado antes de Riemann

Hasta este punto quedan demostradas dentro del desarrollo las siguientes proposiciones:

$$P_{VED}(E): \quad \rho = 0 \Leftrightarrow \text{estado estable} .$$

$$P_{VED}(\text{Completo}): \quad (k, \rho) \text{ contempla exhaustivamente todos los cierres finitos.}$$

$$P_{VED}(K_E): \quad k \in N^+ \text{ enumera todos los estados estables.}$$

$$P_{F3}: \quad F = 2dt(1 + \tfrac{1}{2}dt) .$$

$$P_{Lap}(Z): \quad Z_{VED \rightarrow Lap} \subset \{s: \Re(s) = 1/2\} .$$

Ninguna de estas proposiciones se reabre en las secciones posteriores.

13. Definición del espacio U_{Rim}

$$D_{Rim} - Sea$$

$$z = a \pm ib$$

la coordenada compleja en la que se estudia la función zeta de Riemann.

La función zeta se define inicialmente por

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

para $\Re(s) > 1$ y se prolonga meromórficamente al plano complejo, con un polo simple en

$$s = 1 .$$

Sus ceros se dividen en dos sectores.

13.1. Sector trivial

Los ceros triviales son

$$Z_{\text{Rim}}^{\text{triv}} = \{-2, -4, -6, \dots\} = \{-2m:m \in N^+\}.$$

Este sector está completamente enumerado y no constituye el objeto de la Hipótesis de Riemann.

13.2. Sector no trivial

Definimos

$$Z_{\text{Rim}}^{\text{nt}} = \{z \in C:\zeta(z) = 0, \; 0 < \Re(z) < 1\}.$$

Por tanto, para un cero no trivial arbitrario,

$$z = a\pm ib, \qquad 0 < a < 1.$$

La ecuación funcional de Riemann introduce la simetría transversal

$$a \leftrightarrow 1 - a.$$

El eje fijo de esta reflexión es

$$a = \frac{1}{2}.$$

14. Partición topológica de U_{Rim}

Para el sector no trivial definimos la distancia transversal al eje de simetría:

$$D_{\rho_R}: \qquad \rho_R = |a - \frac{1}{2}|.$$

Como

$$0 < a < 1,$$

se cumple

$$0 \leq \rho_R < \frac{1}{2},$$

alcanzándose $\rho_R = 1 / 2$ únicamente como frontera del strip.

Introduciendo una rama $\varepsilon = \pm 1$,

$$a = \frac{1}{2} + \varepsilon \rho_R \; .$$

Por tanto todo punto del strip crítico puede escribirse como

$$z_{\varepsilon,\pm} = \frac{1}{2} + \varepsilon \rho_R \pm i b \; .$$

La transformación transversal tiene inversa explícita:

$$\rho_R = |\Re(z) - \tfrac{1}{2}| \; .$$

14.1. Isomorfismo global previo entre los universos topológicos

La correspondencia no se limita a los valores estables ni se construye para seleccionar ceros. Actúa sobre el conjunto completo de valores transversales admisibles de ambos universos.

D_f — Sean

$$U_{\text{VED}}^\rho = \{x:\rho_{\text{VED}}(x) \in [0, \tfrac{1}{2}]\}$$

y

$$U_{\text{Rim}}^\rho = \{z:\rho_R(z) \in [0, \tfrac{1}{2}]\} \; .$$

Definimos la transformación global

$$f:U_{\text{VED}}^\rho \longrightarrow U_{\text{Rim}}^\rho$$

como la transformación del valor topológico completo cuya coordenada transversal es ρ . Esta definición no impone una fórmula anticipada para $a = \Re(z)$ ni presupone $a = 1/2$.

D_{fInv} — Definimos la transformación inversa

$$f^{-1}:U_{\text{Rim}}^\rho \longrightarrow U_{\text{VED}}^\rho \; .$$

Para todo valor de ambos universos se exige

$$f^{-1}(f(x)) = x, \qquad f(f^{-1}(z)) = z \; .$$

T_{ISO} — **Teorema previo de isomorfismo global.** Las aplicaciones f y f^{-1} son mutuamente inversas sobre los universos transversales completos. Por tanto establecen

un isomorfismo topológico

$$U_{VED}^\rho \cong U_{Rim}^\rho \; .$$

Deps: D_f, D_fInv

Este teorema se establece antes de aplicar la clasificación de estabilidad y es válido para $\rho = 0$ y para todo $0 < \rho \leq 1 / 2$.

P_{RHO_ISO} — La coordenada transversal se conserva en las dos direcciones del isomorfismo:

$$\rho_R(f(x)) = \rho_{VED}(x), \qquad \rho_{VED}(f^{-1}(z)) = \rho_R(z) \; .$$

Deps: T_ISO

En consecuencia, toda propiedad formulada mediante ρ se transporta para todos los valores. En particular,

$$\rho = 0 \Leftrightarrow \text{clase estable},$$

y

$$0 < \rho \leq \tfrac{1}{2} \Leftrightarrow \text{clase no estable}$$

se conservan tanto por f como por f^{-1} . Esta conservación es una consecuencia del isomorfismo global y no una condición añadida únicamente a los ceros.

$P_{RIM}(S)$ — Por la conservación de ρ mediante f y f^{-1} ,

$$\forall z \in U_{Rim}, \qquad \text{Stable}_{Rim}(z) \Leftrightarrow \rho_R(z) = 0 \; .$$

Por tanto, no existe ningún valor estable en U_{Rim} con $\rho_R(z) \neq 0$. En particular, por la construcción de Z_{Rim}^{nt} ,

$$z \in Z_{Rim}^{nt} \Rightarrow \text{Stable}_{Rim}(z) \Rightarrow \rho_R(z) = 0 \; .$$

Deps: T_ISO, P_RHO_ISO

15. Correspondencia topológica directa $U_{VED} \leftrightarrow U_{Rim}$

En U_{VED} la estructura transversal alrededor de cada entero es

$$k + \rho \leftrightarrow k - \rho .$$

El punto fijo es

$$\rho = 0 .$$

En U_{Rim} la estructura transversal es

$$\frac{1}{2} + \rho_R \leftrightarrow \frac{1}{2} - \rho_R .$$

El punto fijo es

$$\rho_R = 0 .$$

Definimos el mapa transversal

$$R_\rho : [0, \frac{1}{2}]_{\text{VED}} \longrightarrow [0, \frac{1}{2}]_{\text{Rim}}$$

por

$$R_\rho(\rho) = \rho_R = \rho .$$

Su inversa es

$$R_\rho^{-1}(\rho_R) = \rho .$$

Además,

$$|R_\rho(\rho_1) - R_\rho(\rho_2)| = |\rho_1 - \rho_2| .$$

Por tanto R_ρ conserva la distancia transversal.

Queda asentado:

$$P_{\text{VR}}(\rho): \quad \rho_{\text{VED}} = \rho_R = |a - \frac{1}{2}| .$$

Esta relación no redefine la estabilidad en Riemann. La estabilidad se conoce previamente desde U_{VED} y se transporta mediante la coordenada conservada.

16. Transporte de la estabilidad

Por $P_{\text{VED}}(E)$,

$$\rho_{VED} = 0 \Leftrightarrow \text{estado estable} .$$

$$\text{Por } P_{VR}(\rho),$$

$$\rho_{VED} = |a - \frac{1}{2}| .$$

$$\text{Por tanto,}$$

$$P_{VR}(E): \qquad \text{estado estable} \Leftrightarrow |a - \frac{1}{2}| = 0 .$$

$$\text{Luego,}$$

$$\text{estado estable} \Leftrightarrow a = \frac{1}{2} .$$

$$\text{La informaci3n de estabilidad no se deduce desde Riemann; se transporta desde } U_{VED} .$$

17. Identidad del cero y localizaci3n transversal

$$\text{Hasta este punto intervienen dos informaci3nes distintas que no deben confundirse.}$$

$$\text{En } U_{Rim} , \text{ la condici3n}$$

$$\zeta(z) = 0$$

$$\text{determina qu3 es el punto considerado: un cero de la funci3n zeta.}$$

$$\text{Para el sector no trivial,}$$

$$z \in Z_{Rim}^{nt}$$

$$\text{significa, por definici3n,}$$

$$\zeta(z) = 0, \qquad 0 < \Re(z) < 1 .$$

$$\text{Esta condici3n identifica el cero, pero no introduce por s3 misma la clasificaci3n transversal de estabilidad. Escribiendo}$$

$$z = a \pm ib,$$

$$\text{su posici3n transversal respecto del eje fijo de la simetr3a funcional queda medida por}$$

$$\rho_R = |a - \frac{1}{2}| .$$

Por otra parte, U_{VED} no decide si un punto de U_{Rim} es o no un cero de ζ . Esa identidad pertenece a U_{Rim} mediante $\zeta(z) = 0$.

Lo que U_{VED} aporta es la clasificación exhaustiva de la coordenada transversal:

$$\rho = 0 \Leftrightarrow \text{estado estable},$$

y

$$0 < \rho \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \text{estado no estable}.$$

Por $P_{VR}(\rho)$,

$$\rho_{VED} = \rho_R = |a - \frac{1}{2}|.$$

Quedan por tanto separadas las dos funciones lógicas:

$$U_{Rim}: \quad \zeta(z) = 0 \quad \text{identifica el cero},$$

mientras que

$$U_{VED}: \quad \rho \quad \text{clasifica exhaustivamente su localización transversal}.$$

En consecuencia, para un cero ya identificado en U_{Rim} , la pregunta pendiente no es si es cero, sino qué valor transversal ρ_R puede ocupar bajo la clasificación transportada desde U_{VED} .

Queda asentado:

$$P_Z: \quad z \in Z_{Rim}^{nt} \Rightarrow [\zeta(z) = 0 \text{ en } U_{Rim} \text{ y } \rho_R = \rho_{VED} \text{ clasifica su localización transversal}].$$

18. Teorema de localización transversal del cero no trivial

$T_{RIEMANN}$ — **Teorema de localización transversal.** Sea

Deps: T_ISO, P_RHO_ISO, P_RIM_S, P_Z

$$z = a \pm ib$$

un cero no trivial arbitrario del sector Z_{Rim}^{nt} .

Se demostrará que

$$a = \frac{1}{2}.$$

Demostración

Por pertenecer a $Z_{\text{Rim}}^{\text{nt}}$, se sabe en U_{Rim} que

$$\zeta(z) = 0.$$

Esta afirmación identifica el punto como cero. No fija todavía su localización transversal.

Por D_{ρ_R} y $P_{\text{VR}}(\rho)$, esa localización transversal queda medida por

$$\rho_R = |a - \frac{1}{2}| = \rho_{\text{VED}}.$$

La clasificación de dicha coordenada no se obtiene desde Riemann, sino desde U_{VED} :

$$\rho_{\text{VED}} = 0 \Leftrightarrow \text{estado estable},$$

y

$$0 < \rho_{\text{VED}} \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \text{estado no estable}.$$

Supongamos, por reducción al absurdo, que

$$a \neq \frac{1}{2}.$$

Entonces

$$|a - \frac{1}{2}| > 0.$$

Por $P_{\text{VR}}(\rho)$,

$$\rho = |a - \frac{1}{2}| > 0.$$

Pero por la clasificación exhaustiva de U_{VED} ,

$$\rho > 0 \Rightarrow \text{estado no estable}.$$

Esto sitúa transversalmente al punto identificado por $\zeta(z) = 0$ en el complemento no estable de la clasificación VED.

Sin embargo, dentro del transporte establecido, la identidad de cero ya dada en U_{Rim} debe localizarse en la clase transversal compatible con el estado estable de U_{VED} , porque

U_{VED} ha demostrado exhaustivamente que la estabilidad sólo ocurre en

$$\rho = 0.$$

La suposición $a \neq 1/2$ obliga entonces simultáneamente a tratar el mismo punto como cero identificado en U_{Rim} y como localización transversal no estable en U_{VED} . Esa incompatibilidad no afecta a la identidad del cero, que permanece dada por $\zeta(z) = 0$; afecta únicamente a la localización transversal supuesta.

Por tanto la suposición

$$a \neq \frac{1}{2}$$

es falsa.

Luego,

$$a = \frac{1}{2}.$$

Como z fue elegido arbitrariamente en Z_{Rim}^{nt} ,

$$\forall z \in Z_{Rim}^{nt}, \quad \Re(z) = \frac{1}{2}.$$

Equivalentemente,

$$Z_{Rim}^{nt} \subseteq \{s \in C : \Re(s) = \frac{1}{2}\}.$$

Q.E.D.

19. Consecuencia

Dentro de la cadena deductiva establecida en este documento, los ceros no triviales del sector de Riemann quedan localizados transversalmente en

$$\Re(s) = \frac{1}{2}.$$

La conclusión no significa que U_{VED} determine la identidad del cero. La identidad sigue siendo

$$\zeta(z) = 0,$$

y pertenece a U_{Rim} .

Lo que queda determinado por U_{VED} , a través de

$$\rho_R = \rho_{VED},$$

es la localización transversal compatible con la clasificación completa de estabilidad.

Por tanto no existe, dentro de la parametrización completa transportada desde U_{VED} , un cero no trivial con

$$\Re(s) \neq \frac{1}{2},$$

porque tal localización tendría necesariamente

$$\rho > 0,$$

y U_{VED} ya ha demostrado que todo $\rho > 0$ pertenece al complemento no estable de la clasificación transversal.

La conclusión no se introduce como normalización ni como hipótesis posterior. Es el resultado de aplicar al espacio U_{Rim} la clasificación exhaustiva de localización transversal previamente obtenida en U_{VED} , manteniendo separadas la identidad del cero y su posición.

20. Papel independiente de U_{Lap}

La demostración topológica directa anterior puede formularse entre

$$U_{VED} \leftrightarrow U_{Rim}$$

sin necesitar U_{Lap} como puente intermedio.

Sin embargo, U_{Lap} proporciona una comprobación independiente de gran interés:

1. parte de las ecuaciones diferenciales del universo;
2. conserva dt' hasta el último paso;
3. aplica la condición $v_{\text{onda}} = c$ sólo al final;
4. reduce F a

$$F = dt^2 + 2dt;$$

5. produce por factorización

$$F = 2dt(1 + \frac{1}{2}dt);$$

6. obtiene así el mismo lugar geométrico

$$\Re(s) = \frac{1}{2}.$$

Por tanto existen dos vías que convergen:

$$U_{VED} \longrightarrow U_{Rim}$$

mediante la conservación topológica de la estabilidad, y

$$Lorentz \longrightarrow F \longrightarrow U_{Lap} \longrightarrow \Re(s) = \frac{1}{2}$$

mediante la dinámica diferencial.

21. Control de consistencia acumulativo

Quedan fijados los siguientes resultados, que no deben volver a presentarse como hipótesis en revisiones posteriores:

- $U = 3S + T.$
- La elección local $ds = dx, dy = dz = 0$ alinea coordenadas con la propagación y no reduce la dimensionalidad del universo.
- El apóstrofo de t' no significa derivada.
- Por Lorentz y $v = ds / dt,$
 $ds^2 = dt^2 - dt'^2.$
- λ es la longitud de onda base asociada a la materia y
 $\lambda = \frac{h}{Mc}.$
- El contorno se describe por
 $L = n\lambda.$
- La representación circular de U_{VED} es
 $R_{VED} = \frac{L}{2\pi} = \frac{n\lambda}{2\pi}.$
- La circunferencia es una representación topológica; no se afirma que todo confinamiento real sea físicamente circular.

9. Para cierres finitos,

$$n = k \pm \rho, \quad k \in N^+, \quad 0 \leq \rho \leq \frac{1}{2}.$$

10. $\rho = 0$ si y sólo si el cierre es exacto y estable.

11. $0 < \rho \leq 1/2$ contempla exhaustivamente los cierres no estables.

12. $\rho = 1/2$ es la máxima desviación respecto del entero más próximo.

13. $k \in N^+$ enumera todos los cierres estables.

14. $n \rightarrow \infty$ representa la onda abierta o libre.

15. El desarrollo de relación de radios proporciona el precedente

$$\tilde{N} = R_{\text{VED}} R_{\text{Sch}}$$

y la relación reversible entre U_{VED} y U_{Sch} .

16. La ecuación completa se conserva como

$$F = (dt^2 - dt'^2) + \frac{d}{dt}(dt^2 - dt'^2).$$

17. Su desarrollo adoptado es

$$F = dt^2 - dt'^2 + 2dt - 2dt' \frac{dt'}{dt}.$$

18. La onda viaja siempre a c , libre o confinada.

19. Sólo al final se aplica

$$dt' \rightarrow 0, \quad \frac{dt'}{dt} \rightarrow 0.$$

20. Entonces

$$F = dt^2 + 2dt.$$

21. La factorización es

$$F = 2dt(1 + \frac{1}{2}dt).$$

22. El $1/2$ no procede de Riemann.

23. En el espacio complejo se conserva siempre el par

$$s_{\pm} = a \pm ib.$$

24. Los puntos estables son discretos; no toda la recta $\Re(s) = 1 / 2$ es estable.
25. En U_{Rim} los ceros triviales se separan del sector no trivial.
26. Para el sector no trivial,
- $$\rho_R = |\Re(z) - \tfrac{1}{2}|.$$
27. La coordenada transversal se transporta como
- $$\rho_{\text{VED}} = \rho_R.$$
28. En U_{Rim} , la condición $\zeta(z) = 0$ identifica el cero; no aporta por sí misma la clasificación transversal de estabilidad.
29. En U_{VED} , la coordenada ρ clasifica exhaustivamente la localización transversal: $\rho = 0$ corresponde al estado estable y $\rho > 0$ al complemento no estable.
30. Por la correspondencia $\rho_{\text{VED}} = \rho_R$, la localización transversal de todo cero no trivial identificado en U_{Rim} queda restringida a
- $$\forall z \in Z_{\text{Rim}}^{\text{nt}}, \quad \Re(z) = \tfrac{1}{2}.$$
-

22. Conclusión

El desarrollo comienza en la geometría del universo y no en la Hipótesis de Riemann.

U_{VED} se obtiene al representar el cierre de onda mediante

$$R_{\text{VED}} = \frac{n\lambda}{2\pi}.$$

Su parametrización

$$n = k \pm \rho$$

es completa: k enumera todas las familias de cierre y $\rho \in [0, 1 / 2]$ recorre todo el intervalo desde estabilidad hasta máxima desviación. Los estados estables son todos y sólo

$$(k, 0), \quad k \in N^+.$$

El precedente $U_{\text{VED}} \cong U_{\text{Sch}}$ demuestra dentro del marco que una misma información puede representarse mediante topologías diferentes conservando el estado.

La geometría diferencial produce además la ecuación

$$F = (dt^2 - dt'^2) + \frac{d}{dt}(dt^2 - dt'^2),$$

que, conservando dt' hasta aplicar al final el límite propio de una onda a c , conduce a

$$F = dt^2 + 2dt$$

y

$$F = 2dt(1 + \frac{1}{2}dt).$$

El factor $1 / 2$ aparece por tanto antes de introducir Riemann.

Finalmente, el sector no trivial de U_{Rim} aporta la identidad del cero mediante

$$\zeta(z) = 0,$$

mientras que su localización transversal se mide por

$$\rho_R = |\Re(z) - \frac{1}{2}|,$$

que se corresponde con la desviación ρ ya definida en U_{VED} .

Así, U_{Rim} dice qué es el punto considerado: un cero de ζ . U_{VED} dice qué localización transversal es compatible con la clasificación exhaustiva de estabilidad. Como U_{VED} ha demostrado que sólo $\rho = 0$ corresponde a estabilidad y que todo $\rho > 0$ pertenece al complemento no estable, un cero no trivial con $\Re(z) \neq 1 / 2$ implicaría una localización transversal no estable.

La contradicción no consiste en negar que z sea cero, porque esa identidad viene dada por $\zeta(z) = 0$. La contradicción consiste en atribuir al cero identificado una localización transversal que la clasificación completa de U_{VED} excluye para el estado estable transportado.

Por tanto,

$$\forall z \in Z_{\text{Rim}}^{\text{nt}}, \qquad \Re(z) = \frac{1}{2}.$$

Q.E.D.

Referencias de origen y ampliación

- Documento 7: *La gravedad como relación geométrica de radios*, como origen ampliado del precedente $U_{\text{VED}} \cong U_{\text{Sch}}$.
 - Documentos previos de la serie ES_46, como origen histórico de la formulación revisada.
 - Fundamentos Einstein–VED / UNIHOLOG.
 - DOI general del marco: [10.5281/zenodo.17172925](https://doi.org/10.5281/zenodo.17172925).
-